

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mupirox, 20 mg/g, maść *Mupirocinum*

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest Mupirox i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupirox
3. Jak stosować Mupirox
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Mupirox
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Mupirox i w jakim celu się go stosuje

Mupirox ma postać maści. Substancją czynną leku jest antybiotyk mupirocyna. Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych wrażliwymi na antybiotyk mupirocynę szczepami *Staphylococcus aureus*, w tym szczepami metycylinoopornymi oraz innymi gronkowcami i paciorkowcami.

Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie:

- liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraków wywołanych przez *Staphylococcus aureus*, pozostałe gronkowce oraz paciorkowce;
- wtórnych zakażeń skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mupirox

Kiedy nie stosować leku Mupirox:

- jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- do nosa lub do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Mupirox należy omówić to z lekarzem.

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

W przypadku dostania się maści do oka, należy je przemywać wodą, aż do usunięcia pozostałości maści. Nie należy stosować leku do jamy ustnej ani go połykać.

W razie wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia, należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przedłużanie leczenia powyżej okresu zalecanego przez lekarza może spowodować powstawanie drobnoustrojów opornych na lek.

Lek zawiera makrokol, który może wchłaniać się przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę, a następnie wydalac przez nerki. Leku Mupirox nie nalezy uzywac razem z innymi lekami zawierajacymi makrokol, zwlaszcza u osob z umiarkowanymi lub ciezskimi zaburzeniami czynnosci nerek, ze wzgledu na ryzyko wchlaniaia duzych ilosci makroglu.

Dzieci i mlodziez

Mupirox moze byc stosowany u dzieci.

Mupirox a inne leki

Nalezy powiedziec lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takze o lekach, ktore pacjent planuje stosowac.

Nie nalezy jednoczesnie stosowac maści z innymi lekami stosowanymi miejscowo, poniewaz moze to spowodowac rozcieńczenie prowadzace do zmniejszenia dzialania przeciwbakteryjnego oraz mozliwa utrate stabilnosci mupirocyny w maści.

Ciaza, karmienie piersia i wplyw na plodnosć

Jeśli pacjentka jest w ciazy lub karmi piersia, przypuszcza, ze moze byc w ciazy lub gdy planuje miec dziecko, powinna poradziec sie lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciaza

Brak danych odnośnie wplywu leku na plod ludzki.

Nie nalezy stosowac leku w okresie ciazy.

Karmienie piersia

Nie ma dostepnych informacji dotyczacych przenikania mupirocyny do mleka.

Nie nalezy stosowac leku w okresie karmienia piersia.

Prowadzenie pojazdow i obslugiwanie maszyn

Mupirox nie wplywa na zdolnosć prowadzenia pojazdow lub obslugiwania maszyn.

3. Jak stosowac Mupirox

Ten lek nalezy zawsze stosowac zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie watpliwosci nalezy zwrócic sie do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skore.

Na chorobowo zmienione miejsce na skore nalezy naniesc niewielka ilosc maści. Lek zwykle stosuje sie trzy razy na dobe przez okres do 10 dni.

Na leczone miejsce mozna zastosowac opatrunek.

Jeżeli w ciagu 3-5 dni leczenia nie nastapi poprawa, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynnosci nerek

Stosowac ostroznie u pacjentow z umiarkowana lub ciezka niewydolnoscia nerek.

Zastosowanie wiekszej niz zalecana dawki leku Mupirox

W przypadku przedawkowania lub w razie polknienia leku, nalezy zwrócic sie do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Mupirox

Nie nalezy stosowac dawki podwojnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych watpliwosci związanych ze stosowaniem tego leku nalezy zwrócic sie do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

- często: występują u 1 do 10 osób na 100;
- niezbyt często: występują u 1 do 10 osób na 1 000;
- bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 osoby na 10 000.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: pieczenie, swędzenie, wysypka.

Niezbyt często: sucha skóra, wrażliwość na dotyk, kontaktowe zapalenia skóry, zwiększony wysięk.

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Mupirox

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Mupirox

- Substancją czynną leku jest mupirocyna 20 mg/g.
- Pozostałe składniki to: makrogol 3350 i makrogol 400.

Jak wygląda Mupirox i co zawiera opakowanie

Mupirox to biała maść o jednolitej konsystencji.

Tuby aluminiowe zawierające 8 g, 15 g lub 30 g maści, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irlandia

Wytwórca
EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: